

Методическое использование Антисептического спрея

Область применения:

Применяется для гигиенической обработки и бактерицидной обработки рук и в качестве антибактериального средства в учреждениях и в быту. Эффективно в отношении различной этиологии – бактериальной, вирусной и грибковой.

Микробиологическая активность:

Эффективно против грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, грибов (включая дрожжеподобные грибы рода Кандидов, дерматофиты), вирусов.

Состав

Изопропиловый спирт 60% и более, вода 30% и более.

Инструкция к применению

- Хирургическая антисептика рук

Для хирургической антисептики рук могут использоваться те же препараты, что и для гигиенической антисептики. Время обработки до 2-3 мин, в обработку включаются запястья и предплечья. Техника хирургической антисептики: Руки моют водой с жидким мылом (рекомендуется использовать санитарно-технические устройства и дозаторы мыла). Руки обязательно тщательно высушивают, используя стерильные полотенца (салфетки). После высушивания распылить спиртовой антисептик на расстоянии 10-15 см, растереть до полного высыхания. На высохшие руки тотчас надевают стерильные перчатки.

- Дезинфицирующая обработка рук служащих и работников промышленных производств. Руки вымыть с мылом. Нанести на кожу средство, растереть до полного высыхания не менее 15 секунд. Не смывать.

- Возможна обработка твердых поверхностей. Протереть поверхность влажной тканью с применением средств для очистки от загрязнений. После полного высыхания распылить на поверхность спрей на расстоянии около 20 см. Растереть сухой чистой тканью по всей поверхности. Не использовать у открытого огня.

- Дезинфекция помещений. Перед использованием средства вымыть помещение с моющими средствами. Проветрить в течении 15 минут. Распылить средство в помещении, проработав каждый сантиметр избегая попадания на бытовые и промышленные включенные приборы, вблизи раскаленных предметов.
- Дезинфекция воздуха в жилых и нежилых помещениях. Распылить средство вокруг на расстоянии не менее 1,5 метров в количестве необходимом для дезинфекции избегая попадания в глаза, на слизистую и на раскаленные предметы.
- Возможность дезинфекции воздуха и твердых предметов на пищевых производствах. Избегать попадания на слизистую и не распылять вблизи включенных предметов. Оптимально при отсутствии работников провести дезинфекцию воздуха в помещении.
- Применение в целях обеззараживания, пропитывая бинты, ватные тампоны, салфетки и любой другой материал, а также применяется для обработки медицинструмента и любого другого инструмента, и участков тела для проведения процедур уколов.
- Обработка мест укусов комаров и иных насекомых позволяет снизить или вовсе устранить зуд.
- Дезинфекция вне помещений: подходит для обработки тротуаров, дорог, мест скопления людей, стен зданий. Распылить средство по всему периметру, используя индивидуальные средства защиты, оставить до полного высыхания.

Хранение:

Хранить в закрытом виде при температуре от 0 до 30°C отдельно от лекарств в местах, недоступных детям, в складских помещениях, обеспечивающих защиту от воздействия окружающей среды, вдали от нагревательных приборов, открытого огня и прямых солнечных лучей.

Срок годности – 2 года при соблюдении условий хранения в невскрытой упаковке производителя.

Главный специалист
отдела разработок



Е.А. Астахова